



[Адсорбирана ваксина срещу  
човешки папиломавирус  
[тип 6, 11, 16, 18] (рекомбинантна) ]

**Избери за тях днес,  
за да изберат те своето утре.**



**ВАКСИНАТА Е БЕЗПЛАТНА,**  
ако Вашата дъщеря е на 10 до 13 години.

Говорете с Вашия лекар за:

**НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА  
ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА  
МАТОЧНАТА ШИЙКА  
2021 - 2024**

Знаете ли? HPV  
ваксината  
Гардазил може  
да предпази от  
рак на шийката  
на матката.\*



## **С помощта на Gardasil® може да предпазите своите деца от определени HPV-свързани заболявания и рак.\***

HPV (Human Papillomavirus) = ЧПВ (Човешки папиломавирус)

\*Gardasil® е ваксина. Ваксинирането с Gardasil® има за цел да Ви предпази от заболявания, причинявани от човешки папиломавирус (HPV) тип 6, 11, 16 и 18. Gardasil® е ваксина, която се използва след 9-годишна възраст, за предпазване от следните HPV-свързани заболявания и рак: 1) преканцерозни лезии на женските гениталии (шийка, вулва и вагина); 2) преканцерозни лезии на ануса и генитални кондиломи при мъже и жени; 3) цервикален и анален рак.

HPV тип 16 и 18 причиняват приблизително 70 % от случаите на карцином на шийката на матката, 75 %-80 % от случаите на анален рак; 70 % от HPV-свързаните преканцерозни лезии на вулвата и вагината; 80 % от свързаните с HPV случаи на преканцерозни лезии на ануса. HPV тип 6 и 11 са отговорни за приблизително 90 % от случаите на генитални кондиломи. Както при всяка друга ваксина, Gardasil® може да не осигури 100 % защита на тези, които се ваксинират.

Gardasil® не може да причини заболяванията, от които предпазва. Нежелани лекарствени реакции: Най-често наблюдаваните нежелани реакции са реакции в мястото на инжектиране (77,1 % от ваксинираните до 5 дни след всяка визита за ваксиниране) и главоболие (16,6 % от ваксинираните). Тези нежелани реакции са обикновено леки или умерени по интензивност.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Както при всички инжекционни ваксии, подходящо медицинско лечение винаги трябва да бъде лесно достъпно в случай на редки анафилактични реакции след приложението на ваксината. Синкоп (припадък), понякога свързан с падане, може да възникне след или дори преди всяка ваксинация. Това може да бъде придружено от няколко неврологични признака, като преходно зрително нарушение, парестезия и тонично-клонични движения на крайниците по време на възстановяване. Затова е необходимо наблюдение за около 15 минути след ваксиниране. Тази ваксина трябва да се прилага с повишено внимание на лица с тромбоцитопения или някакво нарушение на коагуляцията, тъй като може да се появи кървене след интрамускулно приложение при тези лица.

Дозировка и начин на приложение на Gardasil®: Лица на възраст от 9 до 13 години включително: Gardasil® може да се прилага по 2-дозова схема; Лица на 14 и повече години: Gardasil® трябва да се прилага по 3-дозова схема. Трите дози трябва да се приложат в рамките на 1 година. Моля, говорете с Вашия лекар за допълнителна информация. Необходимостта от бустер доза не е установена.

Лекарствен продукт по лекарско предписание. Преди употреба прочетете листовката!

Мерк Шарп и Доум България ЕООД, София 1407, бул. "Н. Вапцаров" 55, ет. 1, източно крило, Сектори Б1 и Б2, тел: (02) 819 37 37; факс: (02) 862 51 96; e-mail: info-msdbg@merck.com, Veeva code: BG-HPV-00088 EXP: 11/2023

Copyright © 2021 Мерк Шарп и Доум България ЕООД. Всички права запазени. Материалът е получил разрешение от Изпълнителната агенция по лекарствата ИАЛ # A0286/02.12.2021.

Литература: 1. Листовка: информация за потребителя, Gardasil®.